

<p>À PROPOS DE VOTRE TRAITEMENT</p> <p>Votre médecin vous a prescrit Lixiana, un médicament anticoagulant, qui fluidifie votre sang et aide à prévenir la formation de caillots sanguins. Il est important de prendre votre médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte, puis poursuivez le lendemain comme d'habitude ; ne prenez pas deux fois la dose prescrite le même jour. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne commencez pas à prendre d'autres médicaments (y compris des médicaments en vente libre) sans l'avis de votre médecin. • N'arrêtez pas de prendre Lixiana sans avoir consulté votre médecin car cela pourrait augmenter votre risque de formation d'un caillot sanguin. • Veuillez lire la notice présente dans chaque boîte de Lixiana. 	<p>QUAND DEVEZ-VOUS CONSULTER UN MÉDECIN</p> <p>RISQUE DE SAIGNEMENT</p> <p>La prise d'un médicament anticoagulant tel que Lixiana peut augmenter votre risque de saignement. Il est donc important de connaître les signes et symptômes possibles de saignement et de consulter immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ecchymoses ou saignements sous la peau ; • présence de sang dans les urines ; • présence de sang dans les expectorations en toussant ; 	<ul style="list-style-type: none"> • vomissements de sang ou de matières ressemblant à du marc de café ; • saignements de nez ou saignements de plaies prolongés ; • selles noires ; • sensations vertigineuses ou mal de tête soudain ; • fatigue inexplicable ; • saignements vaginaux abondants, incluant des règles plus abondantes que d'habitude ou prolongées. <p>Si vous présentez des symptômes inhabituels, consultez votre médecin.</p>	<p>CARTE DE SURVEILLANCE DU PATIENT</p> <p>Lixiana® comprimés pelliculés edoxaban</p> <p>Veillez porter cette carte sur vous en permanence.</p> <p>Montrez-la à votre médecin, pharmacien, chirurgien ou dentiste avant tout traitement médical ou intervention chirurgicale.</p>
<p>76 mm</p> <p>21 mm</p> <p>49 mm</p>	<p>50 mm</p>	<p>51 mm</p>	<p>BE 113270</p>  <p>53 mm</p>	<p>52 mm</p> <p>↑</p> <p>Veillez détacher cette partie ici.</p>



76 mm	INFORMATIONS SUR LE PATIENT	INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT (À remplir par le médecin)	INFORMATIONS SUR LE PRESCRIPTEUR	INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ	
	Nom du/de la patient(e) : Date de naissance : En cas d'urgence, veuillez contacter : Nom : No de téléphone :	Lixiana a été prescrit à une dose en une prise par jour de : mg Début du traitement le : / (MM/JJ) Groupe sanguin : Autres traitements/pathologies :	Pour plus d'informations ou en cas d'urgence, veuillez contacter : Nom du médecin : Numéro de téléphone, cachet : Signature du médecin :	<ul style="list-style-type: none"> • Lixiana est un anticoagulant oral inhibiteur du facteur Xa. • Si une intervention invasive est nécessaire, le traitement par Lixiana doit être arrêté au moins 24 heures avant l'intervention et des précautions appropriées doivent être prises. • Lixiana peut augmenter le risque de saignement. En cas de saignement cliniquement significatif, le traitement doit être arrêté immédiatement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres de la coagulation tels que l'INR, le temps de Quick (TQ) ou le temps de céphaline activée (TCA) ne sont pas des mesures utiles de l'effet de Lixiana. Cependant, un dosage étalonné de l'activité anti FXa peut aider à guider les décisions cliniques. <p>Pour plus d'informations, veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).</p>
21 mm	52 mm	53 mm	51 mm	50 mm	49 mm

