

## OVER UW BEHANDELING

Men heeft u Lixiana® voorgeschreven, een antistollingsmiddel dat uw bloed verdunt en helpt voorkomen dat u bloedstolsels krijgt. Het is belangrijk dat u uw geneesmiddel precies volgens de instructies van uw arts inneemt.

- Als u een dosis bent vergeten, neem hem dan onmiddellijk in en ga dan de volgende dag normaal door; neem niet het dubbele van de voorgeschreven dosis op een enkele dag in.

- Start niet met andere geneesmiddelen (inclusief zonder voorschrift verkrijgbare) zonder uw arts te raadplegen.

- Stop niet met het innemen van Lixiana® zonder uw arts te raadplegen daar dit uw risico op het ontwikkelen van een bloedstolsel kan verhogen.

- Lees de Patiëntenbijsluiter die u in elke verpakking van Lixiana® vindt.

## WANNEER MOET U MEDISCH ADVIES VRAGEN?

### RISICO OP BLOEDING

De inname van een antistollingsmiddel zoals Lixiana® kan uw risico op bloedingen verhogen. Het is daarom belangrijk zich bewust te zijn van de mogelijke verschijnselen en symptomen van bloedingen en onmiddellijk met uw arts te praten als u een van de volgende zaken ondervindt:

- Bloeduitstorting of bloeding onder de huid
- Bloed in de urine
- Ophoesten van bloed
- Braken van bloed of substantie die lijkt op gemalen koffie

- Neusbloedingen of snijwonden die lang blijven bloeden
- Teerkleurige ontlasting
- Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn
- Onverklaarde vermoeidheid
- Abnormale vaginale bloeding, waaronder zwaardere of langdurige menstruatie

Praat met uw arts als u ongewone symptomen ondervindt.



BE 113271/nl

## PATIËNTEN WAARSCHUWINGS- KAART

Lixiana®

filmomhulde tabletten

edoxaban

Zorg dat u deze kaart  
altijd bij u hebt.

Toon deze kaart vóór elke  
medische behandeling of ingreep aan  
uw beroepsbeoefenaar in de  
gezondheidszorg, apotheker,  
chirurg of tandarts.

## PATIËNTENINFORMATIE

Naam van de patiënt:

  

Geboortedatum:

  

In een noodgeval verzoeken wij u  
contact op te nemen met:

Naam:

  

Telefoonnr.:

## BEHANDELINGS- INFORMATIE

(in te vullen door de arts)

Lixiana® is voorgeschreven op een  
eenmaal daagse dosis van:

mg

Gestart op:

  

Bloedtype:

Andere geneesmiddelen/aandoeningen:

---

---

---

## INFORMATIE OVER DE VOORSCHRIJVER

Voor meer informatie of in geval van nood  
kunt u contact opnemen met:

Naam van de arts:

  

Telefoonnummer, praktijkstempel:

Handtekening van de arts:

---

## INFORMATIE VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG

- Lixiana® is een orale  
antistollingsfactor Xa-remmer.
- Wanneer een invasieve ingreep nodig is,  
dient tenminste 24 uur van tevoren te  
worden gestopt met Lixiana® en dient  
men zeer voorzichtig te zijn.
- Lixiana® kan het risico op bloedingen  
verhogen. In geval van klinisch  
significante bloeding, stop onmiddellijk  
met de behandeling.

- Coagulatietests zoals INR,  
protrombinetijd (PT) of geactiveerde  
partiële tromboplastinetijd (aPTT)  
zijn geen nuttige meting van het  
effect van Lixiana®.  
Een gekalibreerde  
anti-factor-Xa-assay kan echter  
bijdragen tot meer geïnformeerde  
klinische beslissingen.

Raadpleeg de Samenvatting van  
de productkenmerken  
(SPC) voor meer informatie.



Daiichi-Sankyo